

Läufigkeiten und Geburtenkontrolle

HSH arbeiten im Normalfall in Teams, die sich meistens aus Individuen beider Geschlechter zusammensetzen. Eine läufige Hündin kann Unruhe generieren und die Schutzeffizienz einer Hundegruppe reduzieren. Die läufige Hündin und die ganze Gruppe arbeiten nicht mehr konzentriert, manche Hündinnen verlassen sogar die Herde und nicht zuletzt sie sind auch für männliche Wölfe attraktiv. Damit HSH (und übrigens auch Hütehunde) besonders in den Sommermonaten auf den Alpen ihr Bestes leisten können, sollten Hundehalter dem Thema Läufigkeit genügend Beachtung schenken.

Halter von unkastrierten Hündinnen sollten deren Zyklus kennen und im Voraus die nötigen Massnahmen treffen, damit Läufigkeiten nicht auf der Alp stattfindet. Nicht nur Unruhe und herabgesetzter Schutzeffizienz der Hunde gilt es vorzubeugen, sondern natürlich auch unerwünschten Trächtigkeiten. Von einer medikamentösen Läufigkeitsverschiebung würde ich bei (potenziellen) Zuchthündinnen generell abraten, da diese versteckte Folgen auf einen möglichen späteren Zuchteinsatz haben könnte. Im Idealfall werden Zuchthündinnen erst gar nicht auf einer Alp eingesetzt, wenn eine Läufigkeit in den Sommermonaten zu erwarten ist. Ansonsten sollten diese

Hündinnen bei beginnender Läufigkeit zurück auf den Heimbetrieb genommen werden, bis die Läufigkeit vorbei ist.

Hündinnen, die nicht für die Zucht vorgesehen sind, werden am einfachsten chirurgisch kastriert. Hierfür gilt es, den richtigen Zeitpunkt in Abhängigkeit von Alter und Zyklus der Hündin zu finden. Falls der Moment ungünstig für eine chirurgische Kastration erscheint, so kann hier eine medikamentöse Läufigkeitsverschiebung in Betracht gezogen werden.

Letztlich muss jeder Hundehalter unter Berücksichtigung seiner Betriebs- und Weidemanagementsituation für jede seiner Hündinnen individuell die optimale Lösung finden. Im Rahmen von Züchterausschüssen und -weiterbildungen des Verein HSH-CH werden solche Aspekte regelmässig thematisiert und können mit erfahrenen Personen diskutiert werden.

Alberto Stern, Lostalio

Chaleurs et contrôle des mises bas

Normalement, les CPT travaillent en équipes, généralement composées d'individus des deux sexes. Une chienne en chaleurs peut devenir un facteur de troubles susceptibles de réduire l'efficacité protectrice du groupe de chiens. La chienne en chaleurs et le groupe dans son ensemble se déconcentrent de leur travail, certaines femelles quittent même le troupeau. Et surtout, elles sont aussi attractives pour les loups mâles. Les

détenteurs de CPT doivent accorder une attention particulière à la question des chaleurs pour que les CPT (et accessoirement les chiens de conduite) continuent à donner le meilleur d'eux-mêmes, notamment pendant l'été à l'alpage.

Les détenteurs de chiennes non stérilisées devraient connaître leur cycle et prendre à l'avance les mesures nécessaires pour que les chaleurs n'apparaissent pas à l'alpage. Il s'agit de préserver la cohésion et l'efficacité du groupe de chiens mais aussi de prévenir toute gestation indésirable. D'une manière générale, je déconseille d'avoir recours au report des chaleurs par voie médicamenteuse pour les (potentielles) chiennes d'élevage, car ce traitement peut avoir des conséquences latentes sur une possible utilisation ultérieure pour la reproduction. Idéalement, les reproductrices ne devraient même pas du tout être utilisées sur un alpage lorsque des chaleurs sont attendues pendant les mois d'été. Sinon, ces chiennes devraient rentrer à la maison dès le début des chaleurs et jusqu'à leur fin.

Quant aux chiennes qui ne sont pas prévues pour l'élevage, le plus simple est de les faire stériliser chirurgicalement. Ici, il importe de trouver le moment approprié, selon l'âge et le cycle de la chienne. Si le moment semble inapproprié pour une stérilisation chirurgicale, il est possible d'envisager un report des chaleurs par voie médicamenteuse.

Finalement, les détenteurs doivent trouver la solution optimale pour chacune de leurs chiennes, en tenant compte de la situation de leur exploitation et de la gestion de leurs pâturages. Ces aspects de la détention des CPT sont régulièrement traités et discutés avec des personnes expérimentées, dans le cadre des cours de formation et de perfectionnement organisés à l'intention des éleveurs par l'association CPT-CH.

Alberto Stern, Lostalio



Läufigkeiten von Hündinnen können die Schutzeffizienz von HSH-Teams stark reduzieren. Les chaleurs des chiennes peuvent être à l'origine d'une importante réduction de l'efficacité protectrice des équipes de CPT.

(Photo: AGRIDEA)

Adresse

Herdenschutzhunde Schweiz
Chiens de protection des troupeaux Suisse
Jordils 1, CP 128
1000 Lausanne 6

Tel: 021 619 44 31

E-Mail: info@hsh-ch.ch | www.hsh-ch.ch